

ATENÇÃO

ENCONTRA-SE EM ÁREA DE NIDIFICAÇÃO DE ABUTRES

Se nos vem observar...

- **Faça a menor perturbação possível**
- **Não saia do percurso/passadiço**
- **Evite fazer ruído**

Os abutres-do-egipto são os abutres mais pequenos da Europa e estão em declínio. As fêmeas colocam os ovos entre março e maio, que juntamente com o macho compartilham os deveres de incubação durante 42 dias. As ninhadas geralmente têm dois ovos. O segundo ovo geralmente leva até cinco dias a mais do que o primeiro a eclodir. Os filhotes são criados por ambos os progenitores antes de se tornarem independentes após 71 a 85 dias da eclosão.

ABUTRE-DO-EGIPTO *(Neophron percnopterus)*

A atividade de observação de aves, que provoque uma perturbação significativa nas espécies observadas (nomeadamente durante os seus períodos de reprodução), consubstanciará uma ação ilícita, tipificada como infração contraordenacional (prevista e punida nos termos conjugados dos artigos 11.º, n.º 1 e 22.º, n.º 2, alínea a), segundo o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual.

O grifo é uma espécie que se reproduz em colónias e que nidifica sobretudo em saliências ou fendas de escarpas rochosas, construindo um ninho de gravetos e ervas. O seu período de reprodução vai de janeiro a junho, põe um só ovo, branco, que eclode ao fim de 48 a 54 dias. A cria demora 110 a 115 dias até ter condições de realizar o primeiro voo.

GRIFO *(Gyps fulvus)*



Ilustrações: JC Farinha